

ПОЛИОМИЕЛИТ:

как защитить ребенка от вируса неподвижности

Описание: вирусная, инфекция спинного мозга, которая приводит к параличу и может быть смертельной.

Казалось, что эта болезнь была ликвидирована тысяча лет тому назад, после изобретения вакцины, но в 2010 году возникла эпидемия в Таджикистане, и после этого начали болеть российские дети.

Что нужно знать:

- полиомиелит легко предотвратить с помощью вакцины, она принимается внутрь (**сделайте ребенку прививку!**);

предупредить инфекцию легче, чем вылечить;

- у большинства детей начальная стадия полиомиелита протекает как простудное заболевание.

**Сделать ребенку
прививку от**



полиомиелита

Обратитесь к врачу, если:

- вы подозреваете у ребенка полиомиелит.. Для подтверждения диагноза требуются лабораторные анализы;
- непривитый ребенок имел контакт с больным полиомиелитом;
- ребенку не сделана прививка ополлиомиелита.

Симптомы:

- повышение температуры;
- головная боль;
- потеря аппетита;
- рвота
- боли в мышцах;
- параличи (на 3—7-й день болезни).

Инкубационный период:

от 4 до 30 дней (в среднем от 6 до 21 дня).

Лечение:

- хотя вылечить полиомиелит нельзя, можно предупредить его последствия;
- тяжесть полиомиелита у разных детей различна— соответственно различаются и его последствия;
- заболевшего ребенка требуется госпитализировать.



От полиомиелита ребенок может погибнуть



Если возникает подозрение на полиомиелит у больного, ранее не вакцинированного против этого заболевания, он немедленно должен быть направлен в инфекционную больницу для проведения интенсивного лечения. Детям до 15 лет, имевшим тесный контакт с больным острым полиомиелитом, немедленно проводится вакцинация.